

МАСТОГОЛ

Рослинний засіб, що нормалізує функцію жіночої статеві системи.

Таблетки №100.

Склад : кожна таблетка містить сухий екстракт плодів прутняка звичайного (*Vitex agnus castus*) 3,2-4,8 мг, що відповідає 40 мг висушеної рослинної сировини.

Механізм розвитку порушень репродуктивної системи.

гіперпролактинемія*
(абсолютна і відносна)
призводить до ряду
порушень
репродуктивної
системи

- ☑ порушення процесів фолікулогенезу, овуляції і функції жовтого тіла;
- ☑ порушення менструального циклу (від недостатності лютеїнової фази до аменореї);
- ☑ розвиток фіброзно-кістозної хвороби;
- ☑ масталгія;
- ☑ лакторея;
- ☑ передменструальний синдром (ПМС) – пролактин (ПРЛ) є патогенетичною основою кризової і емоційно-психічної форми ПМС;
- ☑ атипова (кризова) форма клімактеричного синдрому.

* - підвищений вміст гормону пролактину в крові.

Механізм дії

Біологічно активні речовини плодів прутняка звичайного мають високу спорідненість до D₂-ендорфінних рецепторів і селективну спорідненість до естрогенових рецепторів. Зв'язуючись з рецепторами фізіологічного інгібітора ПРЛ – дофаміном, МАСТОГОЛ **інгібує вивільнення ПРЛ** з культури пролактотрофних клітин гіпофіза, що призводить до зворотного розвитку патологічних процесів, які обумовлені гіперпролактинемією.

Рослинні агоністи дофаміна (рослинний екстракт *Vitex agnus castus*) позбавлені побічних дій, що робить безпечним їх тривале застосування.

Рекомендації до застосування:

Гіперпролактинемія та спричинені нею наступні порушення:

- мастодія (нагубання та болючість молочних залоз);
- доброякісні новоутворення, в тому числі фіброзно-кістозна мастопатія;
- порушення менструального циклу внаслідок недостатності лютеїнової фази циклу;
- передменструальний синдром (головні болі, психо-емоційна лабільність, набряки);
- клімактеричний синдром.

Спосіб застосування

МАСТОГОЛ приймають по 1 таблетці 1 раз на день.

При рівні ПРЛ до 800 мМЕ/л доза МАСТОГОЛА може не перевищувати 1 таблетку на добу.

При рівні ПРЛ 800–1000 мМЕ/л, доза МАСТОГОЛА може збільшуватись до 2 таблеток на добу.

Лікування триває протягом 3 місяців, без перерви під час менструації. Якщо після відміни препарату скарги поновлюються, то за погодженням з лікарем лікування слід продовжити.



Більш детальну інформацію шукайте на www.farsipharm.com.ua
Фітозасоби ТМ ФарсиФарм запитуйте в аптеках Вашого міста.
Також всю продукцію Ви зможете знайти в Інтернет-магазині
www.phytogol.com.ua

Висновок держ. сан.-епідем. експертизи № 05.03.02-03/35942 від 11.06.2008 р.

