



ЭСТЕРЛАН

Этинилэстрадиол

Таблетки по 0,05 мг

ЭСТЕРЛАН

1 таблетка содержит этинилэстрадиола 0.05 мг; таблетки №30.

ФАРМАКОДИНАМИКА.

При введении в организм вызывает пролиферацию эндометрия, стимулирует развитие матки и вторичных женских половых признаков при их недоразвитии, устраняет общие нарушения недостаточной функции половых желез в организме женщины, а также обладает гипохолестеринемическим действием. Препарат повышает чувствительность мускулатуры матки к окситоцину, неспецифически тормозит действие андрогенов, усиливает абсорбцию кальция и образование кальциевых депо в костях, обладает антигонадотропным действием, снижает работу сальных желез.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Аменорея и олигоменорея, метроррагии (в том числе в климактерическом периоде), заболевания, вызванные недостаточной функцией яичников (дисменорея, гипер- и гипоменорея, нарушения менструального цикла), бесплодие, климактерические нарушения, обычные угри, нежелательная лактация.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

При гипогенитализме и первичной аменорее обычно назначают по 0,05 – 0,1 мг 2 раза в сутки на протяжении 3-4 недель, после чего применяют гестагенные препараты (например, прогестерон) на протяжении 6-8 дней. Курс лечения повторяют 5-6 раз.

При гипофункции яичников и вторичной аменорее назначают препарат в той же дозе 1-2 раза в сутки на протяжении 2-3 недель, затем на протяжении 6-8 дней назначают гестагенные препараты (прогестерон по 5-10 мг в день внутримышечно или прегнин по 10-30 мг 3 раза в сутки).

Взрослым при аменорее и олигоменорее препарат назначают от 25 до 100 мкг в сутки на протяжении 20 дней, далее на протяжении 5 дней вводят внутримышечно прогестерон по 5 мг в сутки.

При климактерических расстройствах женщинам в возрасте до 45 лет назначается суточная доза 0,5 мг этинилэстрадиола ежедневно несколько дней подряд, затем прогестерон или прегнин на протяжении 6-8 дней. Курс лечения повторяют 2-3 раза. Для устранения нервно-сосудистых нарушений при эстрогенной недостаточности препарат назначают по 12,5 – 25 мкг в сутки на протяжении 10-15 дней; курс лечения можно повторить после перерыва на несколько дней.

При дисменорее у женщин с признаками гипоплазии матки этинилэстрадиол назначают сразу после окончания менструации по 12,5 мкг в день на протяжении 2-3 недель каждый день или через день, или же лечение начинают с 4-5-го дня менструального цикла и назначают по 12,5-25 мкг в сутки на протяжении 20 дней; курс лечения повторяют каждые 2-3 месяца.

Для прекращения лактации назначают в первые 3 дня после родов по 25 мкг препарата 3 раза в день, в последующие 3 дня – по 12,5 мкг 3 раза в сутки, затем 12,5 мкг в сутки на протяжении 3 дней.

При лечении обычных угрей препарат 12,5-50 мкг в сутки. У детей старше 12 лет после полового созревания средняя доза препарата составляет 25-50 мкг в сутки. При обычных угрях, развивающихся в период полового созревания, препарат назначают в дозе 12,5-25 мкг.

Дозы препарата и длительность применения следует индивидуализировать в зависимости от характера заболевания и эффективности лечения!