



ЛОРАКСОН

Цефтриаксон

Порошок для приготовления раствора для инъекций по 500 и 1000 мг во флаконах №12

**Микроорганизмы,
высокочувствительные к
ЛОРАКСОНУ**

ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Strep. Group A, B
Streptococcus viridans
Streptococcus bovis

ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Aeromonas spp.
Alcaligenes spp.
Branhamella catarrhalis
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Haemophilus ducreyi
Haemophilus parainfluenzae
Klebsiella spp. (в т.ч. *Kl. pneumoniae*)
Moraxella spp.
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Plesiomonas shigelloides
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Providencia spp.
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella spp. (в т.ч. *S. typhi*)
Serratia spp. (в т.ч. *S. marcescens*)
Shigella spp.
Treponema pal.
Vibrio spp. (в т.ч. *V. cholerae*)
Yersinia spp. (в т.ч. *Y. enterocolitica*)

АНАЭРОБНЫЕ

Bacteroides spp. (в т.ч.
некоторые штаммы *B. fragilis*)
Clostridium spp. (в т.ч. *Cl. difficile*)
Fusobacterium spp.
Peptococcus spp.
Peptostreptococcus spp.

**ЛОРАКСОН (*ceftriaxone*) –
порошок для приготовления раствора для инъекций
по 500 и 1000 мг во флаконах №12**

Лораксон является антибиотиком III-го поколения группы цефалоспоринов с широким спектром антимикробного действия на различные аэробные и анаэробные Gr⁺ и Gr⁻ микроорганизмы, в том числе на синегнойную палочку. Имеет природную устойчивость к β-лактамазам.

Показания к применению. Инфекции, вызванные чувствительными к цефтриаксону микроорганизмами: сепсис; менингит; инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчных путей и желудочно-кишечного тракта); инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи; инфекции у больных с ослабленным иммунитетом; инфекции почек и мочевых путей; инфекции дыхательных путей, особенно пневмония; ЛОР-инфекции (отит, синусит); инфекции половых органов, включая гонорею; профилактика инфекций в хирургии.

Период полувыведения (T_{1/2}): 6-9 ч.

Основной путь выведения из организма: почки/печень=50/50

Проникновение через ГЭБ (% в СМЖ по отношению к сыворотке крови): 4-17%

Способ применения и дозы. Применяют в/в и в/м.

Дозы для взрослых. Обычно назначают 1-2 г Лораксона 1 раз в сутки (каждые 24 часа). Максимальная суточная доза не должна превышать 4 г.

Дозы для детей. Новорожденные (до 2 недель): 20-50 мг/кг массы тела в сутки в 1-2 введения. При определении дозы препарата для доношенных и недоношенных детей отличий нет. **Младенцы и дети** (с 3 недель до 12 лет): суточная доза составляет 20-80 мг/кг массы тела в сутки в 1-2 введения. У детей с массой тела свыше 50 кг назначают дозы для взрослых.

NB! Больным следует продолжать принимать Лораксон еще в течение как минимум 2-3 дней после того, как температура нормализуется и анализы покажут отсутствие возбудителя.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к цефалоспорином и пенициллинам. При наличии у больного повышенной чувствительности к пенициллину следует учитывать возможность перекрестной аллергической реакции. Гипербилирубинемия у новорожденных. Беременность, 1 триместр.

Условия хранения. Хранить в недоступном для детей, сухом, темном месте при температуре не выше 25°C.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией для медицинского применения, а также проконсультируйтесь с врачом.

Регистрационные свидетельства №UA/8584/01/01 и №UA/8584/01/02, утверждено Приказом МЗ Украины № 403 от 22.07.08 г.