



ЭКСИПИМ

Цефетим

Порошок для приготовления раствора для инъекций по 500 и 1000 мг во флаконах №1

ЭКСИПИМ (cefepime)

Порошок для приготовления раствора для инъекций по 500 и 1000 мг во флаконах №1

Микроорганизмы,
высокочувствительные к
ЭКСИПИМУ

Грамположительные

Staphylococcus aureus,
epidermidis, hominis, saprophyticus
Streptococcus pyogenes (группа А)
Streptococcus agalactiae (группа В)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus spp. (группы С, G, F)
Streptococcus bovis (группа D)
Streptococcus viridans

Грамотрицательные

Acinetobacter calcoaceticus
Aeromonas hydrophila
Campylobacter jejuni
Capnocytophaga spp.
Cardnerella vaginalis
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Haemophilus ducrei
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Hafnia alvei
Klebsiella spp.
Legionella spp.
Morganella morganii
Moraxella catarrhalis
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Pseudomonas spp.
Proteus spp.
Providencia spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
Yersinia enterocolitica

Анаэробные

Bacteroides spp.
Clostridium perfringens
Fusobacterium spp.
Mobiluncus spp.
Peptostreptococcus spp.
Veillonella spp.

Антибактериальный препарат группы цефалоспоринов **IV поколения**. Действует бактерицидно, нарушая синтез пептидогликана клеточной стенки и вызывает гибель микроорганизмов. Имеет широкий спектр действия по отношению к Gr+ и Gr- бактериям, штаммам, резистентным к аминогликозидам или цефалоспориновым антибиотикам III поколения.

Показания к применению. Инфекции, вызванные чувствительными к действию препарата микроорганизмами: инфекции дыхательных путей (пневмония и бронхит); инфекции мочевыводящих путей (пиелонефрит); инфекции кожи и мягких тканей; интраабдоминальные инфекции (перитонит); инфекции желчевыводящих путей; гинекологические инфекции; септицемия; фебрильная нейтропения; бактериальный менингит.

Способ применения и дозы. Дозировка и путь введения зависят от чувствительности возбудителей, степени тяжести инфекции, а также функционального состояния почек больного. Рекомендации относительно дозировки препарата Эксипим для взрослых приведены в таблице.

Типы инфекций	Дозы	Кратность введений, каждые
Инфекции мочеполовых путей легкой и средней степени тяжести	0,5-1 г в/в, в/м	12 ч
Другие инфекции легкой и средней степени тяжести	1 г в/в, в/м	12 ч
Тяжелые инфекции	2 г в/в	12 ч
Угрожающие жизни инфекции	2 г в/в	8 ч

Максимальная доза для детей в возрасте от 2 месяцев не должна превышать рекомендуемую дозу для взрослых. Обычная рекомендуемая доза для детей с массой тела до 40 кг составляет 50 мг/кг каждые 12 часов (при фебрильной нейтропении и бактериальном менингите – каждые 8 часов).

Длительность лечения. Обычно длительность лечения составляет 7-10 дней, при тяжелых инфекциях возможно более длительное лечение.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к цефепиму, другим β-лактамам антибиотикам и L-аргинину. Детский возраст до 2 месяцев. Беременность, период кормления грудью.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией для медицинского применения, а также проконсультируйтесь с врачом!

Регистрационные свидетельства №UA/8244/01/01, №UA/8244/01/02 утверждено Приказом МЗ Украины №31 от 22.01.09 г.



www.farsipharm.com.ua
тел./факс: (044) 464-14-01