



ЦИМІФУГОЛ



Рослинний засіб, який нормалізує функцію жіночої статеві системи.

Склад: кожна таблетка містить сухий екстракт коренів циміцифуги кистеподібної (*Cimicifuga racemosa*).....6,5 мг.
Неактивні компоненти: крохмаль кукурудзяний, лактоза безводна, мікрокристалічна целюлоза E 460, магнію стеарат E 470.

Фармакологічні властивості.

ЦИМІФУГОЛ – це засіб рослинного походження, що застосовується для нормалізації функції жіночої статеві системи в період менопаузи. Механізм дії обумовлений властивостями фітоестрогенів, що входять до складу циміцифуги кистеподібної. Фітоестрогени мають органоселективні, естрогенподібні та дофамінергічні властивості. Завдяки цьому ЦИМІФУГОЛ чинить естрогенподібну дію на організм, що дозволяє використовувати його для проведення замісної терапії при дефіциті естрогенів як в період пре- та менопаузи, так і після оваріектомії. Біологічно активні речовини циміцифуги споріднені до рецепторів естрогенів в гіпоталамусі, що призводить до зниження виділення рилізінг-фактору лютеїнізуючого гормону та подальшого зниження секреції лютеїнізуючого гормону передньою долею гіпофіза. Зниження секреції гонадотропінів призводить до усунення психоемоційних та вегетосудинних порушень, які виникають під час пре- та менопаузи, а також естрогенного періоду та обумовлені різким зниженням продукції естрогенів та підвищенням секреції лютеїнізуючого та фолікулостимулюючого гормонів. ЦИМІФУГОЛ викликає проліферацію клітин епітелію піхви, але не призводить до зниження рівня фолікулостимулюючого гормону нижче норми,

що зберігає природну функцію яєчників та підтримує продукцію власних естрогенів. На відміну від синтетичних естрогенів не викликає проліферації ендометрію та не чинить стимулюючої дії на проліферацію клітин естрогенчутливої карциноми молочної залози.

Рекомендації до застосування.

Вегетосудинні і психоемоційні розлади в пре- та менопаузі і клімактеричному періоді, у тому числі приливи, підвищена пітливість, розлади сну, головний біль, підвищена збудливість, депресія.

Спосіб застосування та дози.

По 1 таблетці на день (в один і той самий час вранці або ввечері), запити невеликою кількістю води. Можна застосовувати три-чотири рази на день.

Побічна дія.

Індивідуальні алергічні реакції, рідко — перехідний біль в епігастральній області. Дуже рідко можливе відчуття напруги в молочних залозах, збільшення маси тіла, виділення, подібні менструальним.



Протипоказання.

Індивідуальна чутливість до компонентів. У зв'язку з відсутністю даних про вплив екстракту на естрогензалежні пухлини, препарати циміцифуги не рекомендують назначати пацієнткам, які проходять чи пройшли курс лікування цих захворювань. Пацієнткам із захворюваннями печінки не рекомендується приймати препарати циміцифуги. Не слід застосовувати в період вагітності і лактації.

Особливі вказівки.

Таблетки містять лактозу, що необхідно враховувати під час призначення препарату пацієнткам з її непереносимістю. Пацієнткам репродуктивного віку, які приймають препарати циміцифуги, слід застосовувати засоби контрацепції.

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 30°C.

Термін придатності.

Використати до дати, зазначеної на упаковці.

Упаковка.

Таблетки №30 (3 блістери по 10 таблеток).

Виробник.

GOLDARU Pharmaceutical Co., Іран.

Представник в Україні.

ТОВ «КАМСАБ», м. Київ, вул. М. Раскової, 19, офіс 503, тел. (044) 501 31 89.

